

検査内容変更のお知らせ

謹啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。
この度、下記検査項目におきまして、検査内容の変更をご案内いたします。
健康と医療の未来に貢献すべく、より良い検査サービスのご提供に努めてまいります。
謹白

記

■ 変更日

2024年12月23日（月）ご依頼分より

■ 対象項目

項目コード (旧項目コード)	検査項目	備考
OOD95 3 (OD95 6)	TARC (COVID-19)	・00X25 0 (OX25 2) TARC (薬剤性過敏症症候群) の新規導入 (SRL NEWS No.2024-082) に伴い、備考欄、欄外記載事項について整合性を取るため記載内容を変更いたします



● 変更内容

変更内容	新	現
備考欄	<p>血漿はデータ低下が見られますので避けてください。トロンビン入り採血管は測定値に影響を与える恐れがあるため使用を避けてください。</p>	<p>採血後は速やかに血清分離をしてください。血漿はデータ低下が見られますので避けてください。トロンビン入り採血管は測定値に影響を与える恐れがあるため使用を避けてください。SARS-CoV-2陽性患者の重症化リスクの判定補助のカットオフ値は95.0pg/mLです。SARS-CoV-2陽性患者において、重症（呼吸不全を伴う中等症Ⅱ以上）化する患者のTARC濃度は発症初期からカットオフ値以下の値を示すことが確認されています。</p>
案内書欄外	<p>●TARC（薬剤性過敏症症候群）、TARC（COVID-19）の留意事項</p> <ul style="list-style-type: none"> ・免疫反応においては、一般的に非特異反応により異常高値となる場合があることが知られていますのでご注意ください。 <p><u>薬剤性過敏症症候群（DIHS/DRESS）の診断補助</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ・以下の患者はTARC値に影響を与える恐れがあるため、正確な診断ができない可能性があります。 重症アトピー性皮膚炎患者、皮膚T細胞リンパ腫の患者、移植片対宿主病（GVHD）の疑いがある患者、プレドニン換算で20 mg/日以上ステロイドの全身投与を受けている患者、プレドニン換算で20 mg/日未満のステロイドの全身投与を5日間以上継続されている患者 ・急性期のDIHS/DRESSの診断補助を目的としているため、回復期には使用しないでください。 ・DIHSの重篤副作用疾患別対応マニュアルに記載の判別基準を参照し、他の関連検査及び臨床症状等も含めて総合的に判断してください。 <p><u>SARS-CoV-2陽性患者の重症化リスクの判定補助</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ・SARS-CoV-2陽性患者の重症化リスクの判定補助を目的としているため、重症化後のご依頼は避けてください。 ・重症化する患者でもカットオフ値（95.0 pg/mL）以下であったTARC濃度が病態経過に応じて上昇する症例があるため、SARS-CoV-2陽性患者の重症化リスクの判定補助には、他の関連検査及び臨床症状等により総合的に判断してください。 	<p>●TARC（COVID-19）の留意事項</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SARS-CoV-2陽性患者の重症化リスクの判定補助を目的としているため、重症化後のご依頼は避けてください。 2. 重症化する患者でもカットオフ値（95.0 pg/mL）以下であったTARC濃度が病態経過に応じて上昇する症例があるため、SARS-CoV-2陽性患者の重症化リスクの判定補助には、他の関連検査及び臨床症状等により総合的に判断してください。 3. 免疫反応においては、一般的に非特異反応により異常高値となる場合があることが知られていますのでご注意ください。 4. SARS-CoV-2陽性患者検体をご依頼の際は、カテゴリーBの三重梱包にてご提出ください。 5. SARS-CoV-2陽性患者検体の返却はいたしません。追加検査をご検討の場合は、予備検体の採取・保管をお願いいたします。